

RECOMMANDATIONS POUR SOULAGER LA SENSATION DE BRÛLURE ET DE PICOTEMENT ASSOCIÉE À LA CYSTITE CHEZ LES FEMMES

POUR LES PHARMACIENS SEULEMENT

C'est quoi Cystoplus^{MD} ?

Cystoplus^{MD} est un produit spécialement indiqué pour le soulagement symptomatique de la sensation de brûlure et de picotement associée à la cystite chez les femmes adultes. L'ingrédient actif de Cystoplus^{MD} est le **citrate de sodium**, un agent alcalinisant dont l'efficacité a été démontrée en clinique pour soulager significativement les symptômes de la cystite.[†] Il agit en réduisant l'acidité de l'urine (en augmentant le pH), ce qui diminue les sensations de brûlures et picotements douloureux.

Quand puis-je recommander Cystoplus^{MD} ?

En ce moment, que recommandez-vous pour les symptômes de cystite de votre patiente ? Si vous n'êtes pas certain de ce qui pourrait apaiser les symptômes pendant que le traitement de l'IVU fait effet, penser maintenant à recommander Cystoplus^{MD}.

Recommandez Cystoplus^{MD} :

- Lorsque vous prescrivez un antibiotique^{*,††}
- Pour soulager la sensation douloureuse de brûlure
- Pour soulager la sensation de picotement
- Pour un soulagement symptomatique efficace

... à n'importe quel stade de la cystite.

Cystoplus^{MD} n'est pas recommandé pendant la grossesse ou l'allaitement, et il n'est pas conseillé pour les hommes et les enfants.

Comment puis-je conseiller Cystoplus^{MD} à mes patientes ?

Cystoplus^{MD} est un traitement symptomatique pratique et complet de 48 heures. Conseillez à vos patientes de dissoudre le contenu d'un sachet de poudre aromatisée à la canneberge dans un verre d'eau, et de le boire 3 fois par jour pendant 2 jours. Précisez à vos patientes de ne pas prendre plus de trois sachets par jour. Si elles en prennent plus accidentellement, conseillez-leur de consulter un médecin dans les plus brefs délais.



NPN 80034529

Situé dans la section d'hygiène féminine.



3
fois
par jour



Commandez dès aujourd'hui | Brunet : 30174501 | Familiprix : 441998 | McKesson : 004485 | PJC : 311695

[†] Étude ouverte impliquant 205 femmes présentant des symptômes de cystite sans preuve claire d'infection bactérienne. Les symptômes ont été évalués au début de l'étude et au troisième jour. La gravité des symptômes a été évaluée sur une échelle en quatre points : absent, léger, modéré et sévère.

^{*} IMPORTANT : La patiente ne doit pas répéter le traitement sans avis médical.

^{††} Bien que le produit Cystoplus ne soit pas contre-indiqué en cas d'utilisation avec des antibiotiques, les patientes doivent toujours informer leur médecin si elles prennent d'autres médicaments. Son effet alcalinisant sur l'urine, le citrate de sodium, peut influencer l'excrétion de certains antibiotiques et modifier leur profil pharmacocinétique.

Demandez toujours à votre patiente de bien lire l'étiquette.

Pour plus d'informations, consultez les avertissements, les précautions et les instructions d'utilisation à <https://health-products.canada.ca/lnhpdbsnph/info?licence=80034529> pour des renseignements susceptibles d'aider à évaluer le rapport bénéfice-risque. Les conditions d'autorisation de mise en marché sont disponibles sur demande en appelant au 1888 550-6060.

Cystoplus^{MD} et son logo sont des marques déposées appartenant à Norwell Santé Grand Public inc.

© 2024 Norwell Santé Grand Public inc.